

JULIO 6 DE 2021

# MANEJO BÁSICO DE URGENCIAS EN CASA

CONSULADO DE COLOMBIA EN  
MADRID/PROGRAMA COLOMBIA NOS  
UNE EN EL EXTERIOR

DR. JOSE JHAZING PEADA C.

El futuro es de Todos | Embajada Consulado de Colombia en Madrid | f LIVE

**CHARLAS DE VERANO**  
Manejo básico de urgencias en casa

**DIRIGE**  
Dr. José Jhazing Peada Clavijo, Médico egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, Diplomado en cuidado crítico y emergencias, Máster en Resolución de casos clínicos y docencia, Certificación en Reanimación por la American Heart Association y presidente de la Asociación de Médicos Colombianos en España.

**INVITA**  
Consulado General Central de Colombia en Madrid, con el apoyo de la Asociación de Médicos Colombianos en España.

Martes  
**6 de julio**  
5:00 p.m. España

Transmisión en: ColombiaNosUneMRE

Colombia No.1 Linea | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano | AMCE

## Urgencia


APARICIÓN FORTUITA DE UN PROBLEMA DE CAUSA DIVERSA Y GRAVEDAD VARIABLE QUE GENERA LA CONCIENCIA DE UNA NECESIDAD DE ATENCIÓN

## Emergencia

SITUACIÓN QUE PONE EN PELIGRO INMEDIATO LA VIDA O LA FUNCIÓN DE UN ORGANNO.

RECUERDA: LA EMERGENCIA  
REQUIERE  
QUE ACTUEMOS DE  
FORMA PRECOZ





# PARADA CARDIORRESPIRATORIA

La mal nutrición, el sedentarismo, los hábitos lesivos como el tabaquismo y la ingesta de alcohol, contribuyen al desarrollo de patologías como la Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y la enfermedad coronaria, esta última es la principal causa de parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria.

¡Recuerda! la mayoría de paradas Cardiorrespiratorias son prevenibles.

## AL ENFRENTARNOS A UNA PARADA CARDIORRESPIRATORIA DEBEMOS:

1. IDENTIFICAR A LA PERSONA EN PARADA CARDIORRESPIRATORIA (NO RESPONDE, NO RESPIRA, NO TIENE PULSO)
2. AVISAR A LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA
3. INICIAR COMPRESIONES A UN RITMO DE 100 A 120 COMPRESIONES POR MINUTO DURANTE 2 MINUTOS SEGUIDOS.
4. SI DISPONEMOS DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEBEMOS DE CONECTARLO AL PACIENTE, CON EL OBJETIVO DE DAR LAS DESCARGAS EN CASO DE RITMOS DESFIBRILABLES.
5. COMPROBAR PULSO CAROTIDEO, ANTE LA DUDA CONTINUAR RCP.
6. REANIMACIÓN AVANZADA POR PARTE DEL PERSONAL MEDICO
7. CUIDADOS POSTPARO

## SECUENCIA DE REANIMACION EN PADIATRIA



1. IDENTIFICA DE FORMA PRECOZ LA POSIBLE PARADA CARDIORRESPIRATORIA ( NO RESPONDE, NO RESPIRA, VERIFICO VÍA AÉREA CON EL FIN DE IDENTIFICAR CUERPOS EXTRAÑOS, NO TIENE PULSO)
2. AVISAR A LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA.
3. INICIAR COMPRESIONES CON RELACION 15 COMPRESIONES 2 VENTILACIONES O DE 100 A 120 COMPRESIONES DURANTE 2 MINUTOS .
4. CONECTAR DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO.
5. COMPROBAR PULSO CAROTIDEO, ANTE LA DUDA CONTINUAR RCP .
6. REANIMACIÓN AVANZADA POR PARTE DEL PERSONAL MEDICO
7. CUIDADOS POSTPARO EN LA UNIDAD DE CUIDADO CRITICO PEDIATRICO



## OBSTRUCCIÓN DE LA VIA AEREA

CUANDO ESTAMOS ANTE UNA OBSTRUCCIÓN DE LA VIA AEREA DEBEMOS REALIZAR LA MANIOBRA DE HEIMLICH



### ADULTOS Y NIÑOS

1. identifica el compromiso de la vía aérea.
2. con la mano dominante empuñar y ubicarla por encima del ombligo y con la mano no dominante cubrir el puño con los dedos abrazando al paciente.
3. realice compresiones hacia dentro y arriba hasta lograr que expulse el cuerpo extraño.
4. en caso de pérdida de la conciencia o sospecha de parada cardiorrespiratoria inicie RCP.

### LACTANTES Y NEONATOS

1. Identifica el compromiso de la vía aérea.
2. Verificar si el cuerpo extraño esta en la garganta y retirar.
3. Si no se observa el objeto iniciar 5 compresiones con la palma de la mano dominante entre los omoplatos, luego verificar si se puede extraer el cuerpo extraño, si no, realizar 5 compresiones torácicas en el centro del pecho.
4. En caso de pérdida de la conciencia o sospecha de parada cardiorrespiratoria inicie RCP.

## INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

1. identificar síntomas de forma precoz
2. Dolor típico (dolor en hemitórax izquierdo, irradiado a brazo izquierdo y mandíbula, palpitaciones y sudoración).
3. avisar a los servicios de emergencia.
4. administrar 300 mg de ácido acetilsalicílico.
5. En caso de parada cardiorrespiratoria iniciar maniobras de RCP

### ESCALA DE CINCINNATI



1. Alteración del Habla, Disartria o Lenguaje Incoherente

2. Desviación de la comisura labial o asimetría facial

3. Pérdida de fuerza en extremidades

**TRASLADO URGENTE A URGENCIAS**

## ACCIDENTE CEREBROVASCULAR